

Признаки употребления и действия спайсов

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ЧЕЛОВЕК ПЕРИОДИЧЕСКИ УПОТРЕБЛЯЕТ СПАЙСЫ

Частый кашель без простуды, хриплый голос



Причина: спайсы обжигают слизистую рта и горла

Постоянная жажда, затрудненное глотание



Причина: сухость, жжение во рту и горле

Покраснение глаз или мутность белков, нет реакции зрачков на свет



Причина: лопнувшие капилляры и кровоизлияния в белке глаза



Нарушение ближнего зрения, «мушки» перед глазами



Причина: резкое повышение или понижение артериального давления

Бледность



Причина: анемия и спазмы сосудов

Светобоязнь



Причина: повышенная чувствительность воспаленного глаза к дневному свету

Симптомы передозировки: тошнота, рвота, головокружение, сильная бледность, боль в груди, судороги, потеря сознания

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ЧЕЛОВЕК НАХОДИТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СПАЙСА

Учащенный пульс



Причина: организму требуется больше кислорода (как при физической нагрузке), учащается сердцебиение

Замедление темпа речи и реакций



Причина: нарушение кровообращения в речевых секторах головного мозга

Нарушение координации движения, непроизвольные движения головой, конечностями



Причина: нарушение подачи сигнала от мозга к мышцам

Застывание в одной позе на долгое время (до получаса)



Причина: «затемнение сознания» - галлюцинаторное состояние – всё внимание поглощено собственными переживаниями

Приступы смеха



Причина: спазматические выдыхания, выброс эндорфина

Бред, галлюцинации



Причина: расстройство сознания, нарушения восприятия